

FLORACEL®

Polvo para suspensión oral

COMPOSICIÓN:

Cada sobre contiene:

Saccharomyces boulardii.....200 mg
Excipientes, c.s.

MECANISMO DE ACCIÓN:

Saccharomyces boulardii es una levadura probiótica viva, que actúa ayudando a regenerar la flora intestinal, la cual actúa como microorganismo antidiarreico en el tracto digestivo.

INDICACIONES:

Indicado para el tratamiento sintomático de las diarreas agudas inespecíficas y en la prevención y tratamiento sintomático de los procesos diarreicos producidos por la administración de antibióticos.

DOSIS:

1 sobre (200 mg) cada 12 horas, o según lo prescrito por el médico.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Oral

FORMA DE PREPARACIÓN:

Agregar el contenido del sobre en un vaso con agua, mezclar y administrar inmediatamente, preferiblemente antes de las comidas

CONTRAINDICACIONES:

Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes.

Hipersensibilidad a las levaduras, especialmente Saccharomyces boulardii.

Pacientes con catéter venoso central.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES:

Si la diarrea persiste más de 2 días o aparece sangre en las heces o fiebre, se debe evaluar al paciente reconsiderando el tratamiento y la necesidad de introducir rehidratación oral o parenteral. Embarazo y lactancia.

No se deben abrir los sobres en los alrededores de los pacientes con catéter venoso central, para evitar cualquier colonización, especialmente las transmitidas por las manos al catéter.

INTERACCIONES:

No debe administrarse conjuntamente con tratamientos antifúngicos orales o sistémicos, debido a la naturaleza fúngica de la levadura Saccharomyces boulardii.

No debe mezclarse con bebidas o alimentos muy calientes (superior a 50°C), helados o que contengan alcohol ya que Saccharomyces boulardii contiene células vivas.

EFFECTOS ADVERSOS:

Raros: flatulencia. Muy raros: rash cutáneo, exantema local o generalizado. Reacción anafiláctica.

FLORACEL® es marca registrada de Med Pharma®

"Información adicional, disponible para la clase médica."

Venta bajo prescripción médica.

Producto medicinal, mantener fuera del alcance de los niños.

Almacenar en lugar fresco y seco (no mayor a 30°C).

Medpharma®